

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01 **MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO**
PERIODO DI VALIDITA': **10/06/2024 - 16/06/2024**



**COMPRENSORIO - CS - ZONA
IONICA**

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ALLEGAGIONE	29	0	150%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	16/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCAE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

10/06/2024 - 16/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ALLEGAGIONE	32	0	150%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	16/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCAE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

10/06/2024 - 16/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ALLEGAGIONE	65	0	150%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	16/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCAE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

10/06/2024 - 16/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ALLEGAGIONE	8	0	150%	PEGGIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	16/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCAE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

17/06/2024 - 23/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	13	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

17/06/2024 - 23/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	17	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di *Bacillus thuringensis* o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

17/06/2024 - 23/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	16	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di *Bacillus thuringensis* o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

17/06/2024 - 23/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	22	0	150%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESCIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzoletto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di *Bacillus thuringensis* o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

24/06/2024 - 30/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	20	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	30/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

24/06/2024 - 30/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	20	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	30/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di *Bacillus thuringensis* o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

24/06/2024 - 30/06/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	14	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	30/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESCIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di *Bacillus thuringensis* o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

24/06/2024 - 30/06/2024



COMPRESORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	21	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	30/06/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRESORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state IN ALCUNE AREE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI, IN ALTRE AL DI SOPRA DEI 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRESORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

01/07/2024 - 07/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	16	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno, scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI sopra DEI 30 GRADI, CON UMIDITA' ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

01/07/2024 - 07/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	16	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESCIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno, scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI sopra DEI 30 GRADI, CON UMIDITA' ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

01/07/2024 - 07/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	18	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESCIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno, scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI sopra DEI 30 GRADI, CON UMIDITA' ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

01/07/2024 - 07/07/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA
TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESCIMENTO FRUTTI	15	0	150%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio SETTIMANALE effettuato, SI RILEVA NEL COMPENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA IN LIEVE DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA, AL DI sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO. La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESCIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno, scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzoletto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI sopra DEI 30 GRADI, CON UMIDITA' ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPENSORIO IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.